Nota científica

***Acaulospora alpina* y *Ambispora fennica*, dos nuevos registros de hongos micorrizógenos arbusculares para México**

Figuras 1-6 *Acaulospora alpina*: 1-2. Esporas en PVLG formadas lateralmente sobre el cuello de la hifa del sáculo esporífero (HS) y con presencia de una cicatriz (C). 3-4. Esporas mostrando su patrón de ornamentación (perforaciones cónicas) y las capas que constituyen a la pared externa (SW), intermedia (MW) e interna (IW) de las esporas que no reaccionaron al reactivo de Melzer. 5-6. Esporas en PVLG mostrando su patrón de ornamentación en la capa sw2, la pared interna (IW) constituida de tres capas (iw1-iw3) y la cicatriz (C).



Figuras 7-12 *Ambispora fennica*. 7. Espora con pedicelo (PED) en PVLG. 8-9. Esporas mostrando la pared externa (SW), intermedia (MW) e interna (IW) en que se divide la pared de la espora, con reacción al Melzer de la capa más externa de SW en donde se observa que se disgrega (DIS). 10. Detalle de las tres capas (sw1, sw2 y sw3) que componen la pared del pedicelo y que son continúas con la pared externa (SW) de la espora. 11-12. Composición y número de capas de la pared de la espora: intermedia con dos capas (mw1-mw2) e interna con tres capas (iw1-iw3).