



Distribución y abundancia de crustáceos en humedales de Tabasco, México

Abundance and distribution of crustaceans in wetlands of Tabasco

Everardo Barba*, Juan Juárez-Flores y Feliciano Estrada-Loreto

Departamento de Aprovechamiento y Manejo de Recursos Acuáticos (DAMRA), Área de Sistemas de Producción Alternativos, El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa. Km. 15.5 carretera Villahermosa-Reforma s/n, R/a Guineo Segunda Sección, 86280 Villahermosa, Tabasco, México.

*Correspondencia: ebarba@ecosur.mx

Resumen. El estado de Tabasco presenta una compleja y alta diversidad de humedales que incluye tipos palustres (20.72%), costeros (3.93%), lacustres (1.74%) y ribereños (1.37%), los cuales cubren el 27% del territorio estatal. La diversidad faunística en estos ambientes comprende invertebrados y vertebrados, donde la mayor parte de los registros son de especies de interés comercial. Se presenta el inventario de crustáceos recolectados desde 2003 hasta la fecha en las subregiones Sierra, Ríos y Pantanos. La recolección fue diurna, en 14 localidades (ambientes lóticos y lénicos), mediante nucleador y draga para la infauna, y arrastres con diferentes artes para la epifauna. Se obtuvieron 2 370 organismos que pertenecen a 4 órdenes, 15 familias, 17 géneros y 17 especies. Las especies más abundantes fueron *Discapseudes holthuisi* Bacescu y Gutu, 1975 (62%), *Macrobrachium acanthurus* (Wiegmann, 1836) (12%), *Leptochirus* sp. Zaddach, 1844 (8%) y *Palaemonetes vulgaris* (Say, 1818) (7%), sumando el 89% del total. El 67% de la abundancia correspondió a la infauna y el 33% a la epifauna. El 81% de los crustáceos se capturaron en sistemas lénicos y el resto en sistemas lóticos. Este trabajo contribuye con nuevos registros de crustáceos en humedales de Tabasco.

Palabras clave: crustáceos, humedales dulceacuícolas, Tabasco.

Abstract. The state of Tabasco is characterised by complex and diverse wetlands of different types: palustrine (20.72%), coastal (3.93%), lacustrine (1.74%) and riverine (1.37%), covering 27% of its surface. Faunal diversity of these wetlands includes invertebrates and vertebrates, most of the available records come from species with commercial importance. The list of crustaceans collected from 2003 to date in the subregions Sierra, Ríos and Pantanos, is presented. The sampling at 14 localities was diurnal (lotic and lentic environments), using cores and dredges for the infauna and different nets for epifauna. A total of 2 370 organisms belonging to 4 orders, 15 families, 17 genera and 17 species, was obtained. The most abundant species were: *Discapseudes holthuisi* Bacescu y Gutu, 1975 (62%), *Macrobrachium acanthurus* (Wiegmann, 1836) (12%), *Leptochirus* sp. Zaddach, 1844 (8%) and *Palaemonetes vulgaris* (Say, 1818) (7%), accounting for 89% of the total abundance. Infaunal abundance represented 67% and epifaunal 33%. Eighty-one percent of the organisms were collected in lentic environments and 19% in lotic systems. The present study contributes with new records of crustaceans for the wetlands of Tabasco.

Key words: crustaceans, freshwater wetlands, Tabasco.

Introducción

El estado de Tabasco ocupa el 1.3% del territorio nacional y el 27.7% de su superficie está cubierta por humedales. Estos ecosistemas acuáticos proporcionan hábitat para una gran diversidad de especies, tanto de importancia ecológica como económica. La diversidad faunística en Tabasco cuenta con un total de 896 especies acuáticas y 227 terrestres, entre los registros de especies acuáticas destacan los artrópodos acuáticos, moluscos

y peces; los mejor representados son los moluscos con 164 especies (Sánchez y Barba, 2005), y los crustáceos decápodos con un total de 72 especies (Álvarez et al., 2005).

La proporción de humedales está dominada por sistemas palustres en el 21%, los costeros ocupan un 4%, mientras que los lacustres y ribereños el 1.7 y 1.28%, respectivamente (Barba et al., 2006). En nuestro país, los humedales constituyen unidades ambientales donde concurren múltiples intereses económicos, dada la variedad de recursos que en ellos se encuentran. Estos sistemas están siendo destruidos o modificados sustancialmente, entre

Recibido: 12 noviembre 2009; aceptado: 26 abril 2010

otros factores, por operaciones de drenado y relleno para ganar terreno para la agricultura, construcción de presas, desarrollos urbanos, aporte de sedimentos por erosión, descarga de contaminantes tóxicos y eutrofización, como resultado de malas prácticas agrícolas. En consecuencia ha disminuido su valor y función ecológica natural, al reducirse el nivel de captación de agua y la calidad del hábitat para la fauna silvestre (de la Lanza y García-Calderón, 1995; Sánchez y Barba, 2005).

La alta diversidad de recursos acuáticos distribuidos en las subregiones de Tabasco, las condiciones ecológicas y el grado de conservación de éstos influyen sobre la distribución y abundancia de los organismos acuáticos; por otra parte, se encuentran los factores dependientes del régimen de precipitación, el grado y la amplitud de la inundación (Ramírez y Roldán, 1989; Araúz et al., 2000; Rincón, 2003; Hurtado et al., 2005). No obstante la importancia de los sistemas acuáticos en general, los ambientes estuarinos han recibido mayor atención de investigación por ser zonas de reproducción, crianza y refugio de una gran cantidad de organismos acuáticos estuarino-marinos de importancia ecológica y comercial (Yáñez-Arancibia, 1986). Lo anterior se constata por el mayor número de registros para la zona costera; la subregión de la Chontalpa cuenta con el 68 % de las especies registradas y la subregión Ríos con el 24% (Sánchez y Barba, 2005).

Entre la fauna representativa de los humedales se encuentran los crustáceos, los cuales desempeñan un papel importante en la transferencia energética hacia niveles tróficos superiores (Barba et al., 2000); algunos pueden emplearse como indicadores de la calidad del agua (Álvarez et al., 1996; de la Lanza et al., 2000) y otros, predominantemente marinos (89%), se capturan con fines de consumo. Debido a sus variadas adaptaciones, entre las que destacan la respiración aérea (Díaz y Rodríguez, 1977) y la capacidad de osmorregulación de iones minerales (Mantel y Farmer, 1983), estos organismos han invadido tanto ambientes dulceacuícolas como terrestres representando respectivamente el 10% y 1% de la diversidad (Álvarez et al., 1996).

Aún reconociendo la importancia de los humedales como hábitat, el estado de conocimiento de la biodiversidad de estos ambientes permanece incompleto, lo cual se refleja en los listados faunísticos, en particular en cuanto al número de especies de macroinvertebrados en general. Esto se atribuye a una subestimación en las áreas de captura y a un bajo esfuerzo de recolección de los diversos grupos que componen esta fauna y también por su taxonomía compleja (Sánchez y Barba, 2005). Este trabajo contribuye con nuevos registros de distribución y abundancia de crustáceos en los humedales de Tabasco.

Materiales y métodos

Área de estudio. El estado de Tabasco se localiza en el sureste de México, con una superficie de 24 661 km², cubre desde la planicie costera del golfo de México, hasta las montañas del norte de Chiapas, se ubica entre los 17°15' y 18°39' N y los 91°00' y 94°07' O. Tabasco representa el 1.3% del territorio nacional, se divide en 5 subregiones: Chontalpa, Ríos, Sierra, Centro y Pantanos. Predominan los climas cálido-húmedo con lluvias todo el año, cálido-húmedo con abundantes lluvias de monzón y cálido-húmedo con lluvias en verano, con una temperatura media anual de 26°C y máxima de 42°C (INEGI, 2008). Las localidades estudiadas abarcaron la heterogeneidad de los humedales dulceacuícolas en las subregiones de Tabasco (Fig. 1; Cuadro 1).

Caracterización ambiental. Se cuantificaron las condiciones ambientales en las localidades de muestreo. Las variables físico químicas evaluadas *in situ* fueron: pH, temperatura, concentración de oxígeno disuelto (OD), y las evaluadas *ex situ*: nitratos y amonio en agua y pH en sedimento (Cuadro 2), mediante sondas multiparamétricas de la marca HANNA, modelos HI-9818 y HI-98185, respectivamente. Las muestras de agua se tomaron a media columna con una botella Van Dorn de 2.5 L y el sedimento con una draga Petite Ponar. La materia orgánica se cuantificó mediante el método propuesto por Walkley y Black (Sparks et al., 1996).

Captura de organismos. Los organismos de la infauna se recolectaron mediante un nucleador Ljkelkamp® de 5 cm de diámetro con un área de 0.0019 m² y una draga Petite Ponar con un área de 0.025 m²; para la epifauna se empleó una red de cuchara de 0.5 m² de área, una red de barra tipo




Figura 1. Localidades de muestreo en las subregiones del estado de Tabasco.

Cuadro 1. Ubicación de las localidades de muestreo en los humedales de Tabasco por Municipio y subregión

<i>Localidad</i>	<i>Municipio</i>	<i>Subregión</i>	<i>UTM</i>	
1 Río Frontera (RF)	Centla	Pantanos	536152	2046984
2 Simón Sarlat (SS)	Centla	Pantanos	517914	2016820
3 Arroyo Polo (AP)	Centla	Pantanos	536916	2046186
4 Canal (C)	Centla	Pantanos	540905	2031441
5 La Puerta 3 (LP3)	Centla	Pantanos	542256	2030860
6 Laguna San Pedrito (LSP)	Centla	Pantanos	542197	2030983
7 Río Carrizal (RC)	Nacajuca	Centro	496504	2010101
8 Río Teapa (RT)	Teapa	Sierra	508893	1962375
9 Dren Artificial 1 (DA1)	Teapa	Sierra	507159	1953770
10 R. Puyacatengo (RP)	Tacotalpa	Sierra	511583	1945536
11 Dren Artificial 2 (DA2)	Tacotalpa	Sierra	513440	1944922
12 Río Puxcatán (RPX)	Tacotalpa	Sierra	544152	1944720
13 Arroyo Madrigal (AM)	Tacotalpa	Sierra	518544	1939241
14 Arroyo Polevá (PVA)	Tenosique	Ríos	666681	1928731

Renfro con un área de barrido de 50 m² (Renfro, 1962), así como recolectas manuales. Las muestras se fijaron con formalina al 4% para su posterior procesamiento. Los individuos fueron separados utilizando un tamiz con luz de malla de 0.5 y 0.75 µm, y preservados en alcohol al 70%.

Los organismos se identificaron hasta el menor nivel taxonómico posible, mediante las claves de Bousfield (1972), Felder (1973), Pennak (1978), Williams (1984), Thorp y Covich (1991), Raz-Guzman et al. (1992), Raz-Guzman y Sánchez (1996) y Villalobos (1998). Para el arreglo sistemático se siguió lo propuesto por Martin y Davis (2001). Los organismos se encuentran depositados en la Colección de Referencia del Laboratorio de Ecología Acuática de ECOSUR- Unidad Villahermosa.

Análisis de datos. Las localidades de recolecta fueron agrupadas mediante un análisis de componentes principales (ACP), y para conocer la correlación existente entre las variables ambientales y la biota se aplicó un análisis de correspondencia canónica (ACC) que sirvió, a su vez, para determinar cuáles son las variables que tienen una mayor influencia en el ordenamiento de los patrones de datos de la comunidad (McGarigal et al., 2000). Los datos de las variables ambientales y la abundancia de los organismos fueron transformados a Ln (N+1). La dominancia de las especies en frecuencia y abundancia se determinó mediante el ordenamiento de Olmstead-Tukey (Sokal y Rohlf, 1994), considerando especies dominantes, típicas, oportunistas y raras.

Resultados

Descripción ambiental. Las localidades de muestreo fueron

caracterizadas de acuerdo con las condiciones físicas-químicas registradas. Se presentaron temperaturas cálidas de 23°C a 28°C, con pH básico y una OD relativamente alta (4.0 - 6.0 mg/l), con excepción de las localidades Canal (C) y río Teapa (RT), donde el OD fue menor (2.0 - 3.6 mg/l). En la concentración de amonio se presentaron valores elevados (2.04 - 2.85 mg/l) en las localidades Canal (C), Puerta 3 (LP3), laguna San Pedrito (LSP), río Frontera (RF) y río Carrizal (RC). También los nitratos tuvieron valores elevados (1.51 - 6.25 mg/l) (Cuadro 2).

La ordenación de las localidades mediante el ACP mostró que los 2 primeros componentes explicaron el 57.67% de la variación total; el primer componente conformó el 37.40% de acuerdo con las variables de amonio, nitratos y la profundidad, mientras que el segundo sumó el 20.27%, representado por la temperatura y el pH (Cuadro 3). El primer grupo lo formaron las localidades 8 a 14, de las subregiones de Ríos (Tenosique) y Sierra (Teapa y Tacotalpa), y el segundo las localidades 1, 4, 5, 6 y 7 de la subregiones Pantanos (Centla) y Centro (Villahermosa). La localidad 11 (dren artificial 2- DA2) quedó aislada al presentar un pH ácido de 5.87 (Fig. 2).

Composición y abundancia de crustáceos. Se recolectaron 2 370 organismos correspondientes a 4 órdenes, 15 familias, 17 géneros y 17 especies; en la epifauna se contabilizaron 13 especies, mientras que 4 especies fueron para la infauna. Las especies mejor representadas en términos de abundancia relativa total fueron: *Discapseudes holthuisi* Bacescu y Gutu, 1975 (61.7%), *Macrobrachium acanthurus* (Wiegmann, 1836) (11.7%), *Leptocheirus* sp. Zaddach, 1844 (7.64%) y *Palaemonetes vulgaris* (Say, 1818) (6.67%), sumando el 87.71%, el valor mínimo correspondió a *Periclimenes americanus* (Kingsley, 1878)

Cuadro 2. Valores promedio de los parámetros físico-químicos en las localidades de muestreo y tipo de substrato (VFE= vegetación flotante emergente, VC= vegetación circundante, VAS= vegetación acuática sumergida y SSSV= substratos suaves sin vegetación)

Localidad / variable Unidades	Temp.	pH	OD	Z	Transp.	NH ₄	NO ₃	Substrato
	°C	mg/l	m	m	mg/l	mg/l		
1 Río Frontera (RF)	28.20	7.60	4.60	3.00	0.45	2.85	1.98	VFE
2 Simón Sarlat (SS)	28.00	7.65	5.25	4.00	0.17	0.00	0.00	VC, VFE
3 Arroyo Polo (AP)	27.00	7.66	5.50	2.00	0.85	0.00	0.00	VAS
4 Canal (C)	28.50	7.58	3.60	3.00	0.75	2.27	1.70	VC
5 La Puerta 3 (LP3)	26.20	7.87	5.04	2.10	0.95	2.04	1.51	VC
6 Laguna San Pedrito (LSP)	27.00	7.58	6.00	1.50	0.75	4.28	5.50	VAS
7 Río Carrizal (RC)	25.70	8.03	4.50	1.15	0.56	6.25	7.57	SSSV
8 Río Teapa (RT)	25.50	7.66	2.00	1.50	0.45	0.00	0.00	SSSV
9 Dren Artificial 1 (DA1)	25.70	7.76	4.00	1.50	0.85	0.00	0.00	SSSV
10 R. Puyacatengo (RP)	26.93	7.54	4.00	1.00	0.55	0.00	0.00	SSSV
11 Dren Artificial 2 (DA2)	28.16	5.87	4.00	1.55	0.75	0.00	0.00	VAS
12 Río Puxcatán (RPX)	23.40	7.60	4.00	1.80	1.15	0.00	0.00	SSSV
13 Arroyo Madrigal (AM)	24.00	8.00	4.00	1.30	0.70	0.00	0.00	VAS
14 Arroyo Polevá (APVA)	27.00	7.15	4.00	1.10	1.00	0.00	0.00	VC

Cuadro 3. Matriz factorial ambiental del ACP para las localidades de muestreo

	Eje 1	Eje 2
Temp.	0.219	-0.623
pH	0.153	0.734
OD	0.300	-0.041
Profundidad	0.351	-0.190
Transparencia	0.195	-0.109
NH ₄	0.591	0.086
NO ₃	0.572	0.128

con 0.04% del total (Cuadro 4).

El análisis Olmstead-Tukey para la abundancia presentó 4 especies dominantes: *M. acanthurus*, *Procambarus (Austrocambarus) llamasii* Villalobos, 1954, *D. holthuisi* y *Leptocheirus* sp.; las oportunistas fueron 4: *P. vulgaris*, *Hyalella azteca* Zaddach, 1844, *Leptochelia rapax* (Harger, 1879) y *Armases ricordi* (H. Milne Edwards, 1853); hubo 2 especies típicas, *Rhithropanopeus harrisii* (Gould, 1841) y *Potamocarcinus hartmanni* Pretzmann, 1975 y 6 fueron raras (Fig. 3).

De acuerdo con sus hábitos, *D. holthuisi* fue especie dominante para la infauna con 1 457 organismos; las oportunistas fueron *Leptocheirus* sp. y *P. (Austrocambarus)*




Figura 2. Ordenación de las localidades basada en las variables ambientales mediante el análisis de componentes principales (ACP).

llamasii, y 1 especie típica, *L. rapax* (Fig. 4). Para la epifauna se obtuvieron 2 especies dominantes, *M. acanthurus* y *R. harrisii*; 3 oportunistas, *P. vulgaris*, *Leptocheirus* sp. y *A. ricordi*; 3 típicas, *P. hartmanni*, *Uca* sp. Leach, 1814 y

Potimirin mexicana (Saussure, 1857), y las especies raras fueron *H. azteca*, *Processa* sp. Leach, 1815 y *P. hartmanni* (Fig. 5).

Distribución de la abundancia por subregiones y ambientes. La distribución de los crustáceos en los humedales de Tabasco mostró que el 81% de la abundancia total se capturó en 4 localidades (C, LSP, LP3, LSP) de la subregión Pantanos en sistemas léticos; la localidad con el máximo valor de abundancia correspondió a la LSP con 1 534 individuos, mientras que el mínimo fue para LP3 con 11 individuos (Cuadro 5).

En relación con el número de especies, la localidad LSP (subregión Pantanos), presentó 6 especies: *Callinectes similis* (Williams, 1974) y *R. harrisi* registradas sólo para este sistema; *D. holthuisi*, *Leptocheirus* sp., *M. acanthurus* y *Sphaeroma terebrans* (Bate, 1866), especies compartidas con las localidades LSP y C. Para la localidad SS se capturaron de manera exclusiva *H. azteca* y *Procambarus llamasii*, y en LP3, las especies *D. holthuisi* y *S. terebrans* (Cuadro 5).

Los sistemas lóticos constaron de 10 localidades y contribuyeron con el 20% del total de organismos. Espacialmente, las localidades AP-3, RF y DA2, mostraron la mayor abundancia de organismos, con 296 (63%), 61 (13%) y 49 (10%) de manera respectiva; mientras que las localidades RC y RT presentaron la menor abundancia con

1 organismo cada una. En cuanto al número de especies, el máximo correspondió a AP con 9, y en 6 localidades sólo se registró 1 especie (Cuadro 5).

Agrupaciones faunísticas. El ACP para infauna presentó 2 agrupaciones, la primera conformada por las localidades C, LSP y LP3 y la segunda por la localidad AP (subregión Pantanos). Los 2 primeros componentes conformaron el 92.57% de la variación total (Fig. 6). El ACC de la infauna y las variables ambientales se explica por los 2 primeros componentes con un 98.5% de la variación total, donde las variables amonio, nitratos, profundidad y temperatura determinaron esta ordenación (Cuadro 6). La especie *L. rapax* se correlacionó negativamente con estas variables y positivamente con el pH, mientras que *D. holthuisi* se correlacionó con la temperatura. *Leptocheirus* sp. Se asoció positivamente con el OD y negativamente con la temperatura y la profundidad (Fig. 7).

El ACP aplicado a la epifauna, conformó 3 grupos que explicaron el 52.88% de la variación total en los 2 primeros componentes (Fig. 8). El primer grupo lo conformaron las localidades C, LP3, LSP (subregión Pantanos) en ambientes léticos, con abundancias máximas; un segundo grupo, las localidades AP y RF en ambientes lóticos y con influencia salina. La última agrupación la constituyeron el resto de las localidades pertenecientes a las subregiones Sierra, Centro y Ríos en ambientes lóticos (Fig. 9).

Cuadro 4. Composición taxonómica, abundancia total y relativa de los crustáceos en los humedales de Tabasco

Orden 4	Familia 15	Género 17	Especie	Abundancia núm. organismos	Abundancia %
Amphipoda	Aoridae	<i>Leptocheirus</i>	sp. Zaddach, 1844	181	7.64
	Gammaridae	<i>Hyalella</i>	<i>azteca</i> Saussure, 1857	33	1.39
	Ischyroceridae	<i>Erichthonius</i>	<i>brasiliensis</i> (Dana, 1852)	2	0.08
Isopoda	Sphaeromatidae	<i>Sphaeroma</i>	<i>terebrans</i> Bate, 1866	8	0.34
Tanaidacea	Apseudidae	<i>Discapseudes</i>	<i>holthuisi</i> Bacescu y Gutu, 1975	1 464	61.77
	Pseudozeuxidae	<i>Leptochelia</i>	<i>rapax</i> (Harger, 1879)	62	2.62
Decapoda	Atyidae	<i>Potimirim</i>	<i>mexicana</i> (Saussure 1857)	2	0.08
	Cambaridae	<i>Procambarus</i>	<i>llamasii</i> Villalobos, 1954	85	3.59
	Grapsidae	<i>Armases</i>	<i>ricordi</i> (H. Milne Edwards, 1853)	38	1.60
	Palaemonidae	<i>Macrobrachium</i>	<i>acanthurus</i> (Wiegmann, 1836)	278	11.73
		<i>Palemonetes</i>	<i>vulgaris</i> (Say, 1818)	158	6.67
		<i>Periclimens</i>	<i>americanus</i> (Kingsley, 1878)	1	0.04
	Portunidae	<i>Callinectes</i>	<i>similis</i> Williams, 1974	2	0.08
	Processidae	<i>Processa</i>	sp. Leach, 1815	12	0.51
	Pseudothelphusidae	<i>Potamocarcinus</i>	<i>hartmanni</i> (Pretzmann, 1975)	14	0.59
Xanthidae	<i>Rhithropanopeus</i>	<i>harrisii</i> (Gould, 1841)		24	1.01
Ocypodidae	<i>Uca</i>	sp. Leach, 1814		6	0.25




Figura 3. Jerarquización de las especies de crustáceos en los humedales del estado de Tabasco por su abundancia.




Figura 4. Jerarquización de las especies de crustáceos de la infauna en los humedales del estado de Tabasco por su abundancia.




Figura 5. Jerarquización de las especies de crustáceos de la epifauna en los humedales del estado de Tabasco por su abundancia.

En la epifauna el ACC explicó el 52.88% de la variación total en los 2 primeros componentes (Fig. 9). Los nutrientes OD y profundidad tuvieron mayor influencia en la ordenación y distribución de las especies (Cuadro 7). Las especies *M. acanthurus*, *S. terebrans*, *P. llamasii* y *C. similis* presentaron correlación positiva con los nitratos y amonio; *R. harrisii* y *Uca sp.* se correlacionaron positivamente con el pH y el OD; mientras que *P. hartmanni* y *P. mexicana*

Cuadro 5. Número de especies, abundancia y hábitos de los crustáceos por localidad y subregión. (R= número de especies, N= número de organismos, Hábito: E= epifauna, I= infauna)

Localidad	Municipio	Subregión	R	N	Hábito E/I	
Lénticos						
2	SS	Centla	Pantanosa	2	33	31/2
4	C	Centla	Pantanosa	4	321	202/119
5	LP3	Centla	Pantanosa	1	11	0/11
6	LSP	Centla	Pantanosa	6	1 534	71/1463
Lóticos						
1	RF	Centla	Pantanosa	4	61	61/10
3	AP	Centla	Pantanosa	9	296	182/114
7	RC	Nacajuca	Centro	1	1	1/0
8	RT	Teapa	Sierra	1	1	1/0
9	DA1	Teapa	Sierra	2	18	1/17
10	RP	Tacotalpa	Sierra	3	20	3/17
11	DA2	Tacotalpa	Sierra	1	49	0/49
12	RPx	Tacotalpa	Sierra	1	11	11/0
13	AM	Tacotalpa	Sierra	1	11	7/0
14	APva	Tenosique	Ríos	1	7	7/0




Figura 6. Ordenación de las localidades basada en la abundancia de organismos de la infauna mediante el Análisis de Componentes Principales (ACP).

Cuadro 6. Coeficientes canónicos del ACC correspondiente a la infauna y variables ambientales de los dos primeros componentes

	Eje 1	Eje 2
Temperatura	-0.424	0.360
pH	0.334	0.450
OD	0.419	-0.795
Profundidad	-0.234	0.864
Transparencia	-0.495	-0.472
NH_4	-0.890	-0.430
NO_3	-0.787	-0.615

mostraron correlación negativa. Finalmente, *H. azteca* y *A. ricordi* tuvieron correlación positiva con la temperatura y negativa con los nutrientes (Fig. 9).

Discusión

Caracterización ambiental. En general las localidades presentaron buenas condiciones en cuanto a las concentraciones de oxígeno disuelto, con excepción de C y RT, que las tuvieron por debajo del mínimo requerido para la protección de la vida acuática. En contraste, el amonio y los nitratos sobrepasaron los límites máximos permisibles




Figura 7. Ordenación de las especies de crustáceos basada en la matriz ambiental y biológica.




Figura 8. Ordenación de las localidades basada en la abundancia de la infauna mediante el Análisis de Componentes Principales (ACP).




Figura 9. Ordenación de las localidades basada en la abundancia de la epifauna mediante el Análisis de Componentes Principales (ACP).

para la protección de la vida acuática (SEDUE, 1989; CNA, 2003), en las localidades RF, SS, C, LP3, LSP (subregión Pantanos) y RC (subregión Centro). Esto podría explicarse debido a la posición geográfica de las localidades en la cuenca baja del sistema Grijalva-Usumacinta, donde se reciben los aportes provenientes de las cuencas alta y media. La zona alta y media presentan zonas con diferentes usos de suelos, donde destacan los cultivos y diferentes actividades antrópicas, así como descargas de la ciudad de Villahermosa. Aunque la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla es un área natural protegida, se realizan diferentes actividades dentro de ella, siendo las principales amenazas el cambio del flujo hidrológico y de uso de suelo para agricultura y ganadería (Hargrave, 2001).

La localidad DA2 se ubicó de manera aislada del grupo debido a su valor de pH ácido, lo que pudiera relacionarse con la descomposición de la vegetación acuática sumergida y liberación de taninos en esta localidad. Dicho ordenamiento fue confirmado mediante el ACP, separó a las localidades en 2 grupos asociando las localidades RF, C, LP3 y LSP (subregión Pantanos), situadas en áreas asociadas con asentamientos humanos y/o parcelas de cultivo. Estas actividades generan un cambio en el uso de suelo, en especial en las márgenes ribereñas, donde la pérdida de cobertura vegetal disminuye la cantidad de hábitats acuáticos disponibles, incrementan la tasa de sedimentación y provocan valores bajos en la abundancia y riqueza de macroinvertebrados (Sharitz y Batzer, 1999) y peces dulceacuícolas, que deterioran la estructura trófica (Barnes y Mann, 2001).

Composición faunística. El mayor número de especies de la epifauna se puede explicar por los flujos hidrológicos de la región, así como por la disponibilidad de sustratos con vegetación y microhabitats, que proveen áreas de reproducción y protección para un elevado número de organismos (Williams, 1980; MacFarlane, 1983; Bailey y Litterick, 1993; Covich et al., 1999). El menor número de especies de la infauna puede deberse a los aportes

Cuadro 7. Coeficientes canónicos del ACC correspondiente a la epifauna y variables ambientales de los dos primeros componentes

	Eje 1	Eje 2
Temperatura	-0.106	-0.314
pH	-0.058	-0.461
OD	-0.951	-0.195
Profundidad	-0.646	-0.969
Transparencia	0.289	-0.426
NH ₄	-0.776	5.218
NO ₃	1.559	-4.949

de sedimentos y material en suspensión proveniente de cuenca arriba y con ello gran cantidad de agroquímicos, y a la homogeneidad del sustrato (Malavoi y Souchon, 2002) y consumo por depredadores (Barba et al., 2000). La comparación del número de especies por subregión mostró qué pantanos tuvieron los valores máximos debido a una mayor disponibilidad de hábitat dada por la vegetación de manglar, vegetación emergente, flotante y vegetación acuática sumergida, en las que se asocia una mayor diversidad y abundancia de organismos (Macintosh et al., 1999; Barba, 2005; Barba y Sánchez, 2005; Barba et al., 2005), así como al transporte pasivo mediante la vegetación acuática flotante (Tankersley et al., 2002).

Distribución y ecología. Presentaron distribución restringida a ambientes tropicales y dulceacuícolas 3 especies: *Procambarus llamas*, dulceacuícola de zonas inundadas y pantanos (Hobbs, 1989); *P. mexicana*, de arroyos de montaña hasta grandes ríos cercanos a la costa (Martínez-Mayén y Román-Contreras, 2005) y *P. hartmanni*, de aguas someras y rocosas, en aguas limpias con restos de vegetación (Álvarez et al., 2005).

Las especies *Erichtonius brasiliensis* (Dana, 1852), *D. holthuisi*, *M. acanthurus*, *P. vulgaris*, *P. americanus*, *R. harrisi*, *L. rapax*, *S. terebrans*, *C. similis*, *A. ricordi*, *Uca* sp., *Processa* sp. y *Leptocheirus* sp., son especies con una amplia distribución y tolerancia a ambientes oligohalinos y costeros, asociados a sustratos con vegetación marginal y circundante, así como sumergida y flotante (Sánchez et al., 1998; Escobar-Briones et al., 1999).

De acuerdo con Álvarez et al. (2005), están registradas 72 especies de crustáceos, de los cuales 44 contabilizaron para decápodos y peracáridos. En este trabajo se listan 17 especies para ambos grupos (Cuadro 8); pese a que se lista un menor número, se agregan al inventario las especies *E. brasiliensis*, *Leptocheirus* sp., *P. vulgaris*, *P. americanus* y *Processa* sp. Se considera que existe una subestimación de los registros para invertebrados y en especial de crustáceos, ya que la mayoría de los estudios se han efectuado con especies de importancia comercial (Sánchez y Barba, 2005).

Agrupaciones faunísticas. De acuerdo con el ACP, se conformaron 3 grupos; el primero con las localidades C, LP3 y LSP, pertenecientes a las subregiones Pantanos y Centro; el segundo con las localidades de las subregiones Centro y Ríos. La separación de las localidades AP y RF (subregión Pantanos) se debió a registros únicos para estos sitios, representados para RF por las especies *Uca* sp. y *Processa* sp., y para AP (subregión Pantanos) por *L. rapax*, *P. vulgaris* y *P. americanus*, que combinados con la influencia salina de la boca del río Frontera marcaron una diferencia.

Las agrupaciones obtenidas por el ACC mostraron

que los nutrientes fueron los factores determinantes para su formación, donde *D. holthuisi*, *M. acanthurus*,

S. terebrans y *C. simillis*, caracterizaron la subregión de Pantanos, siendo estos sitios los de mayores valores en

Cuadro 8. Registro de crustáceos para Tabasco (1= Álvarez et al., 2005; 2= este estudio)

Crustáceos Peracáridos y Decápodos	1	2
<i>Hyalella azteca</i> Saussure, 1857	X	X
<i>Platorchestia platensis</i> (Kroyer, 1845)	X	
<i>Erichthonius brasiliensis</i> (Dana, 1853)		X
<i>Leptocheirus</i> sp Zaddach, 1844		X
<i>Sphaeroma terebrans</i> Bate, 1866	X	X
<i>Discapseudes holthuisi</i> Bacescu y Gutu, 1975	X	X
<i>Leptochelia rapax</i> Harger, 1879		X
<i>Farfantepenaeus aztecus</i> (Ives, 1891)	X	
<i>Farfantepenaeus duorarum</i> (Burkenroad, 1939)	X	
<i>Litopenaeus setiferus</i> (Linnaeus, 1767)	X	
<i>Xiphopenaeus kroyeri</i> (Heller, 1862)	X	
<i>Lucifer faxoni</i> Borradaile, 1915	X	
<i>Atya scabra</i> Leach, 1815	X	
<i>Potimirim mexicana</i> (Saussure, 1857)	X	X
<i>Macrobrachium acanthurus</i> (Wiegmann, 1836)	X	X
<i>Macrobrachium acherontium</i> Holthuis, 1977	X	
<i>Macrobrachium carcinus</i> (Linnaeus, 1758)	X	
<i>Macrobrachium heterochirius</i> (Wiegmann, 1836)	X	
<i>Macrobrachium hobbsi</i> Nates y Villalobos, 1990	X	
<i>Macrobrachium olfersii</i> (Wiegmann, 1836)	X	
<i>Palaeomonetes vulgaris</i> (Say, 1818)		X
<i>Periclimenes americanus</i> (Kingsley, 1878)		X
<i>Processa</i> sp. Leach, 1815		X
<i>Procambarus (Austrocambarus) acanthophorus</i> Villalobos, 1948	X	
<i>Procambarus (Austrocambarus) llamasii</i> Villalobos, 1954	X	X
<i>Callinectes rathbunae</i> Contreras, 1930	X	
<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1895	X	
<i>Callinectes similis</i> Williams, 1974	X	X
<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	X	X
<i>Cardisoma guanhumi</i> Latreille, 1825	X	
<i>Platychirograpsus spectabilis</i> de Man, 1896	X	
<i>Aratus pisonii</i> (H. Milne Edwards, 1837)	X	
<i>Armases americanum</i> (Saussure, 1858)	X	
<i>Armases cinereum</i> (Bosc, 1802)	X	
<i>Armases ricordi</i> (H. Milne Edwards, 1853)	X	X
<i>Goniopsis cruentata</i> (Latreille, 1802)	X	
<i>Sesarma crassipes</i> Cano, 1889	X	
<i>Sesarma curacaoense</i> de Man, 1892	X	
<i>Uca burgersi</i> Holthuis, 1967	X	
<i>Uca marguerita</i> Thurman, 1981	X	
<i>Uca pugnax</i> (Smith, 1870)	X	
<i>Uca rapax</i> (Smith, 1870)	X	
<i>Uca vocator</i> (Herbst, 1804)	X	
<i>Uca</i> sp. Leach, 1814		X
<i>Ucides cordatus</i> (Linnaeus, 1763)	X	
<i>Potamocarcinus hartmanni</i> Pretzmann, 1975	X	X
<i>Odontotheplhusa maxillipes</i> (Rathbun, 1898)	X	
<i>Odontotheplhusa monodontis</i> Rodríguez y Hobbs, 1989	X	
<i>Tehuana chontalpaensis</i> Villalobos y Álvarez, 2003	X	
<i>Avotrichodactylus bidens</i> (Bott, 1969)	X	
<i>Avotrichodactylus constrictus</i> (Pearse, 1911)	X	
Número total	44	17

estas variables; *Uca* sp. y *R. harrisii* se correlacionaron con el OD y *Armases ricordi* con la temperatura. Sin embargo, los resultados aquí obtenidos mostraron que las variables de mayor importancia fueron los nutrientes, y en menor proporción la temperatura y el OD (Williams, 1980; Statzner et al., 1988; Allan, 1995).

Lo anterior sugiere la necesidad de ampliar el estudio de otros humedales debido a la importancia de estos hábitats en cuanto a su cobertura en Tabasco. Por otro lado, el conocimiento de los crustáceos y otros invertebrados acuáticos como organismos bioindicadores en los humedales constituye una herramienta potencial para caracterizar el estado de salud de estos ambientes.

Agradecimientos

Los autores agradecemos los apoyos otorgados por los proyectos: "Programa de consolidación institucional: investigadores mexicanos del CONACYT". Convenio específico Ref. 323201-1 Exp. 020314; "Taller sobre manejo de bordos en el estado de Tabasco" (SEDAFOP-ECOSUR); "Conservación y mejoramiento de suelos en Tabasco: tecnologías para el restablecimiento a la fertilidad de suelos y para controlar la erosión hídrica" (SEDAFOP-ECOSUR), e "Inventario de las microcuencas del municipio de Balancán, Tabasco" (Fondo Mixto-CONACYT -Gobierno del Estado de Tabasco TAB-2006-C06-46385). Por otro lado, las facilidades otorgadas al Posgrado de ECOSUR para la realización de salidas a campo del curso Humedales: ecología y manejo, de la Maestría en Ciencias Naturales y Desarrollo Rural.

Literatura citada

- Allan, J. D. 1995. Stream ecology, structure and function. Chapman & Hall, London. 350 p.
- Álvarez, F., J. L. Villalobos y E. Lira. 1996. Decapoda. In Biodiversidad, taxonomía y biogeografía de artrópodos de México: hacia una síntesis de su conocimiento, vol. I, J. E. Llorente, A. N. García-Aldrete y E. González (eds.). Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad / Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. p. 103-129.
- Álvarez, F., J. L. Villalobos, y R. Robles. 2005. Crustáceos. In Biodiversidad del estado de Tabasco, Cap. 8, J. Bueno, F. Álvarez y S. Santiago (eds.). Instituto de Biología, UNAM/ Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México, D.F. p. 177-194.
- Araúz, B., R. Amores y E. Medianero. 2000. Diversidad y distribución de insectos acuáticos a lo largo del cauce del río Chico (Provincia de Chiriquí, República de Panamá). Scientia 15:27-46.
- Bailey, R. G. y M. R. Litterick. 1993. The macroinvertebrate fauna of water hyacinth fringes in the Sudd swamps (Nile River, Southern Sudan). Hydrobiologia 250:97-103.
- Barba, E. 2005. Valor del hábitat: Distribución de peces en humedales de Tabasco. ECOfronteras 25:9-11.
- Barba, E. y A. J. Sánchez. 2005. Peracardid crustaceans of central Laguna Madre, Tamaulipas, in the southwestern Gulf of Mexico. Gulf of Mexico Science 23:241-247.
- Barba, E., A. Raz-Guzman y A. J. Sánchez. 2005. Distribution patterns of estuarine caridean shrimps in the southwestern Gulf of Mexico. Crustaceana 78:709-726.
- Barba, E., J. Rangel-Mendoza y R. Ramos-Reyes. 2006. Clasificación de los humedales de Tabasco mediante sistemas de información geográfica. Universidad y Ciencia 22:101-110.
- Barba, E., A. J. Sánchez, A. Raz-Guzman y M. E. Gallegos. 2000. Dieta natural y tasa de forrajeo del carideo *Hippolyte zostericola* Smith sobre epífitas de *Thalassia testudinum* Banks et Solander ex König. Hidrobiológica 10:139-146.
- Barnes, R. S. K. y K. H. Mann. 2001. Fundamentals of aquatic ecology, segunda edición, Blackwell, Toronto, Ontario. 270 p.
- Bousfield, E. L. 1972. Shallow-water, Gammaridean Amphipoda of New England. Comstock/Cornell University Press, Ithaca, New York 312 p.
- Comisión Nacional del Agua. 2003. Ley federal de derechos y normas aplicables en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes. Diario Oficial de la Federación, México, D.F., 2 de enero: 173-191.
- Covich, A. P., M. A. Palmer y T. A. Crowl. 1999. The role of benthic invertebrate species in freshwater ecosystems. Bioscience 49:119-127.
- de la Lanza, G. y J. L. García-Calderón. 1995. Lagos y presas de México. Centro de Ecología y Desarrollo, México, D.F. 320 p.
- de la Lanza, G., S. H. Pulido y J. L. P. Carvajal. 2000. Organismos indicadores de la calidad del agua y de la contaminación (bioindicadores). Plaza y Valdez / Comisión Nacional del Agua, SEMARNAP/Instituto de Biología, UNAM, México, D.F. 633 p.
- Díaz, H. y G. Rodríguez. 1977. The branchial chamber of some terrestrial and semiterrestrial crabs. Biological Bulletin 153:485-504.
- Escobar-Briones, E., F. Álvarez y G. Salgado. 1999. *Discapseudes holthisi* (Crustacea: Tanaidacea) as an intermediate host of *Caballerolynchus lamothei* (Acanthocephala: Cavaomidae). Journal of Parasitology 85:134-137.
- Felder, D. L. 1973. An annotated key to crabs and lobsters (Decapoda, Reptantia) from coastal waters of the northwestern Gulf of Mexico. Center for Wetland Resources, Louisiana State University, Baton Rouge. 103 p.
- Hargrave, B. T. 2001. Impacts of man's activities on aquatic systems. In Fundamentals of aquatic ecology, R. S. K. Barnes y K. H. Mann (eds.). Blackwell, Toronto, Ontario. p. 245-264.
- Hobbs, H. H., Jr. 1989. An illustrated checklist of the American crayfishes (Decapoda: Astacidae, Cambaridae, and Parastacidae). Smithsonian Contributions to Zoology

- 480:1-236.
- Hurtado, S., F. García-Trejo y P. J. Gutiérrez-Yurrita. 2005. Importancia ecológica de los macroinvertebrados bentónicos de la subcuenca del río San Juan, Querétaro, México. *Folia Entomológica Mexicana* 44:271- 286.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2008. http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/datosgeograficos/estados/tab_geo.cfm; última consulta: 12.III.2009.
- Macintosh, D., J. Goncalves, F. Soares, S. M. Moser y N. Paphavisit. 1999. Transport mechanisms of crab megalopae in mangrove ecosystems, with special reference to a mangrove estuary in Ranong, Thailand. In *Mud crab aquaculture and biology*, C. P. Keenan y A. Blackshaw (eds.). Proceedings of an International Scientific Forum held in Darwin, Australia, 21- 24 April 1997, ACIAR Proceedings, p. 178-186.
- Malavoi, J. R. e Y. Souchon. 2002. Description standardisée des principaux faciès découlement observables en rivière: clé de détermination qualitative et mesures physiques. *Bulletin Français de Peche et Pisciculture* 365/366:357-372.
- Mantel, L. H. y L. L. Farmer. 1983. Osmotic and ionic regulation. In *The Biology of Crustacea*, vol. 5, Internal anatomy and physiological regulation, D. Bliss y L. Mantel (eds.). Academic, New York. p. 53-161.
- Martin, J. W. y G. E. Davis. 2001. An updated classification of the recent Crustacea. Natural History Museum of Los Angeles County, Science Series 39, 124 p.
- Martínez-Mayén, M. y R. Román-Contreras. 2005. Notes on the fertility of *Potimirim mexicana* (De Saussure, 1857) (Decapoda, Atyidae) in Laguna de Términos, Gulf of Mexico. *Crustaceana* 78:29-40.
- McFarlane, M. B. 1983. Structure of benthic macroinvertebrate communities in a midwestern plain stream. *Freshwater Invertebrate Biology* 2:147-153.
- McGarigal, K., S. Cushman y S. Stanfford. 2000. Multivariate statistics for wildlife and ecology research. Springer, New York. 283 p.
- Pennak, R. W. 1978. Fresh water invertebrates of the United States. Wiley, New York. 628 p.
- Ramírez, J. y G. Roldán. 1989. Contribución al conocimiento limnológico y de los macroinvertebrados acuáticos de algunos ríos de la región del Uraba antioqueño. *Actualidades Biológicas* 18:113-121.
- Raz-Guzman, A. y A. J. Sánchez. 1996. Catálogo ilustrado de cangrejos braquiuros (Crustacea) de la laguna de Tamiahua, Veracruz, México. Cuaderno 31. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, 52 p.
- Raz-Guzman, A., A. J. Sánchez y L. A. Soto. 1992. Catálogo ilustrado de cangrejos braquiuros y anomuros (Crustacea) de la laguna de Alvarado, Veracruz, México. Cuaderno 14, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, 51 p.
- Renfro, W. C. 1962. Small beam net for sampling postlarval shrimp. Galveston Biological Lab. June 30, 1962. U. S. Fisheries and Wildlife Services Circular 161:86-67.
- Rincón, M. E. 2003. Comunidad de insectos acuáticos de la quebrada Mamarramos (Boyacá, Colombia). *Revista Colombiana de Entomología* 14:3-13.
- Sánchez, A. J. y E. Barba. 2005. Biodiversidad de Tabasco. In *Biodiversidad del estado de Tabasco*, J. Bueno, F. Álvarez y S. Santiago (eds.). Instituto de Biología, UNAM/CONABIO, México, D.F. p. 1-16.
- Sharitz, R. R. y D. P. Batzer. 1999. An introduction to freshwater wetlands in North America and their invertebrates. In *Invertebrates in freshwater wetlands of North America: ecology and management*, D.P. Batzer, R.B. Rader y S.A. Wissinger (eds.). Willey, New York. p. 1-21.
- Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 1989. Criterios Ecológicos de la Calidad del Agua. CE-CCA-001/89. Diario Oficial de la Federación, 13 diciembre de 1989.
- Sparks D.L., A. L. Page, P. A. Helmke, R. H. Loepert, P. N. Soltanpour, M. A. Tabatabai, C. T. Johnston y M. E. Sumner (eds.). 1996. Methods of soil analysis, part 3. Chemical methods. Soil Science Society of America Book Series, Madison, Wisconsin. 1390 p.
- Sokal, R. R. y F. J. Rohlf. 1994. Biometry. The principles and practice of statistics in biological research, third edition. Freeman, New York 880 p.
- Statzner, B., J. A. Gore y V. H. Resh. 1988. Hydraulic stream ecology: observed patterns and potential applications. *Journal of the North American Benthological Society* 7:307-360.
- Tankersley, R. A., J. M. Welch y R. B. Forward. 2002. Settlement times of blue crab (*Callinectes sapidus*) megalopae during flood-tide transport. *Marine Biology* 141:863-875.
- Thorp, J. H. y A. P. Covich. 1991. Ecology and classification of North American freshwater invertebrates. Academic, San Diego, California. 911 p.
- Villalobos, J. L. 1998. Taxonomía de los crustáceos con énfasis en el orden Decapoda. Instituto de Biología, UNAM, México, D.F. 33 p
- Williams, D. D. 1980. Some relationships between stream benthos and substrate heterogeneity. *Limnology and Oceanography* 25:166-172.
- Williams, A. B. 1984. Shrimps, lobsters and crabs of the Atlantic coast of the Eastern United States, Maine to Florida. Smithsonian Institution, Washington, D.C. 550 p.
- Yáñez-Arancibia, A. 1986. Ecología de la zona costera. Análisis de siete tópicos. A.G.T., México, D.F. 189 p.